

NUPRID AL 600 FS

INSECTICID



Conține 600 g/l imidacloprid, formulat sub formă de suspensie.
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2352/19.12.2006.

TEHNICA DE APLICARE

Tratamentul semințelor destinate însămânțărilor se face cu mașini echipate pentru tratarea pe cale semiumedă/umedă a semințelor, bine reglate, pentru asigurarea dozelor recomandate și a unei bune și uniforme acoperiri a semințelor.

MOD DE ACȚIUNE

Este un produs sistemic, cu acțiune de contact și prin ingestie. După aplicarea pe sămânță, **Nuprid AL 600 FS** pătrunde în aceasta, se translocă în plantele ce răsar și le protejează în prima perioadă de vegetație, asigurând o foarte bună protecție împotriva dăunătorilor din sol care prejudiciază culturile agricole în acest stadiu.

Acționează rapid asupra insectelor, bazându-se pe efectul imediat asupra sistemului nervos al acestora, pe care îl dereglează.

Formularea superioară asigură o acoperire uniformă și protecție de lungă durată a boabelor.

MOD DE UTILIZARE

La doza de produs recomandată / tona de sămânță se pot adăuga 0,5 - 7 litri de apă pentru fiecare tonă de sămânță, în funcție de cultură și, de asemenea, de MMB, puritate, etc.

MOD DE UTILIZARE

Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA
Grâu, orz, orzoaică	Afide (<i>Schizaphis graminum</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Rhopalosiphum maidis</i>)	0,6 l/tonă
	Viermi sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)	0,7 l/tonă
	Gândacul ghebos (<i>Zabrus tenebrioides</i>)	1 l/tonă
Rapiță *	Puricele verzei (<i>Phyllotreta spp.</i>)	6,0 l/tonă
Floarea soarelui *	Gărgărița frunzelor (<i>Tanymecus dilaticollis</i>) Viermi sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)	10,0 l/tonă
Porumb *	Viermi sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)	6,0 l/tonă
	Rățișoara porumbului (<i>Tanymecus dilaticollis</i>)	8,0 l/tonă
	Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica virgifera</i>)	10,0 l/tonă

* Omologări suspendate temporar.